**PENAMBATAN MOLEKULER SENYAWA XANTON PADA KULIT BUAH
MANGGIS (*Garcinia Mangostana* L.) DENGAN ENZIM COX-2 Sebagai
Kandidat Antikanker Payudara.**

Herson Cahaya Himawan*1., Lilik Sulastri²., Verari Vernando³

1. Program Studi Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor
2. Program Studi Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor
3. Mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor

Korespondensi: hersonindonesia2011@gmail.com

ABSTRAK

Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum diderita oleh wanita diseluruh dunia. Kanker payudara diketahui memiliki kaitan erat dengan inflamasi kronis yang dikontrol oleh siklooksigenase-2 (COX-2). Kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* L.) mengandung senyawa golongan xanton. Senyawa tersebut memiliki potensi sebagai inhibitor enzim COX-2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa yang paling aktif dari senyawa xanton. Potensi senyawa xanton diuji toksisitasnya menggunakan Toxtree, analisis toksisitas difokuskan pada karsinogenisitas dan mutagenisitas. Hasil uji toksisitas senyawa ligan dengan perangkat lunak Toxtree didapatkan hasil bahwa senyawa 1-Isomangostin hydrate, 3-Isomangostin hydrate, Euxanthone, BR-xanthone A, Garcimangosone B dan Garcimangosone D diprediksi aman untuk digunakan sebagai obat. Kemudian senyawa tersebut dianalisis berdasarkan kriteria *Lipinski's Rule of Five* untuk memprediksi penyerapan obat dalam tubuh. Hasil analisis menunjukkan, lima senyawa hasil analisis memenuhi kriteria-kriteria Lipinski kecuali Garcimangosone D. Selanjutnya dilakukan penambatan molekuler menggunakan Autodock Vina. BR-xanthone A memiliki energi ikatan (ΔG) terbaik yaitu -10,1 kkal/mol jika dibandingkan dengan senyawa uji lainnya, dan mendekati energi ikatan (ΔG) senyawa pembanding selekoksib -12,4 kkal/mol.

Kata kunci: Kanker payudara, penambatan molekuler, COX-2, ksanton.

ABSTRACT

Breast cancer is one of the most common types of cancer suffered by women around the world. Breast cancer is known that has relationship with chronic inflammation that is controlled by cyclooxygenase-2 (COX-2). Pericarp of mangosteen (*Garcinia mangostana* L.) contains a class compound of xanthone. The compound has potential as an inhibitor of the COX-2 enzyme. The purpose of this research is to know the most active compound of xanthone compounds. Potential of xanthone compounds tested the toxicity by using Toxtree, the analysis of toxicity is focused on the carcinogenicity and mutagenicity. The result of toxicity test of ligand compound with Toxtree software found that the compound of 1-Isomangostin hydrate, 3-Isomangostin hydrate, Euxanthone, BR-xanthone A, Garcimangosone B and Garcimangosone D predicted safe for use as medicine. Then the compound itself analyzed based on the criteria of *Lipinski's Rule of Five* to predict the drug absorption in the human body. The analysis showed, five compounds fulfilled the criteria of Lipinski except Garcimangosone D. Further analysis was molecular docking using Autodock Vina. BR-xanthone A had a binding energy (ΔG) the best that was -10.1 kcal / mol if it compared to other test compounds, approaching the binding energy (ΔG) comparative compound of celecoxib -12.4 kcal / mol.

Keyword: Breast cancer, molecular docking, COX-2, xanthone

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kanker payudara adalah kanker yang paling umum menyerang wanita di seluruh dunia [1]. Pengobatan kanker payudara yang selama ini telah dilakukan berupa pembedahan, kemoterapi, radioterapi, terapi dengan hormon atau dengan terapi antibodi monoclonal [2]. Beberapa obat komersial yang berkhasiat sebagai antikanker payudara memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan senyawa obat baru yang lebih aman dan efektif dari bahan alam. Salah satunya adalah kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* L.). Kulit buah manggis (*Garcinia Mangostana* L.) adalah sumber xanton dan zat bioaktif lainnya. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis memiliki aktivitas sitotoksik yang kuat pada sel MCF-7 dengan IC_{50} sebesar $45 \mu\text{g/mL}$ melalui mekanisme apoptosis [3]. Beberapa senyawa xanton yang diketahui memiliki aktivitas terhadap sel kanker payudara, α -mangostin mempunyai aktivitas apoptosis pada sel kanker payudara MDA-MB231 [4]. Kanker payudara telah diketahui memiliki hubungan yang erat dengan inflamasi kronis. Inflamasi didalam sel dikontrol oleh enzim COX-2. Enzim COX-2 yang berperan mensintesis prostaglandin ini, diketahui memiliki kaitan dengan perkembangan kanker payudara. Sintesis berlebihan pada COX-2 ditemukan pada kanker payudara [5]. Penghambatan pada enzim COX-2 berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat antikanker payudara. Mekanisme interaksi antara COX-2 dan senyawa xanton ini dapat diteliti dengan metode penambatan molekul. Pada penelitian ini akan dilakukan pencarian kandidat obat antikanker payudara menggunakan metode penambatan molekul. Senyawa xanton dari kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* L.) sebagai ligan uji dan selekoksib sebagai kontrol positif dengan enzim COX-2 sebagai reseptor.

Penambatan molekul pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak Autodock Vina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

interaksi antara beberapa senyawa xanton dengan enzim COX-2.

METODE PENELITIAN

Bahan : Struktur 3D Makromolekul Struktur 3D COX-2 diunduh dari Protein Data Bank (PDB) melalui situs [6]. Makromolekul protein yang dipilih adalah COX-2 dari *Mus musculus* yang didapat dari metode kristalografi X-ray dengan resolusi $2,4 \text{ \AA}$. Identitas makromolekul tersebut adalah 3LN1 dengan format *.pdb. Struktur 3D Ligan Struktur 3D ligan yang digunakan adalah senyawa xanton dari kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* L.) dan sebagai pembanding selekoksib. Struktur 3D ligan-ligan tersebut diunduh dari Pubchem melalui situs [7].

Alat: Perangkat Keras Notebook Asus (AR5B125) dengan spesifikasi Intel(R) Celeron(R) CPU 847 @ 1.10GHz 1.10GHz, RAM (Random Access Memory) 4,0 gigabyte (3,40 gigabyte usable), kartu grafis (Intel (R) HD Graphics). Notebook terhubung dengan AC/DC adapter dan terkoneksi internet. Perangkat Lunak

Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 32 bit, paket AutodockTools yang terdiri atas Python 2.7.13 dan MGLTools 1.5.6 (Scripps Research Institute), Open Babel 2.4.1, Discovery Studio Visualizer 2016 (Accelrys Enterprise Platform), Autodock Vina, Pymol (Delano Scientific LLC.), LigPlot+, Marvin Sketch, Toxtree dan situs [7]

Metode

Penyiapan Struktur Makromolekul

Makromolekul COX-2 diunduh dari *Protein Data Bank* (PDB) dengan situs [6]. Identitas makromolekul yang akan digunakan yaitu 3LN1. Data makromolekul diunduh dalam format *.pdb. Makromolekul protein dipisahkan dari pelarut dan ligan yaitu residu non standar. Pemisahan makromolekul dari molekul yang tidak diperlukan dilakukan dengan menggunakan program Discovery Studio Visualizer 2016. Hasil pemisahan tersebut akan digunakan untuk penambatan molekul. Hasil pemisahan disimpan dalam format *.pdb. Makromolekul yang

telah dipisahkan dari residu dioptimasi dengan AutodockTools. Optimasi tersebut meliputi: penambahan atom hidrogen dan pengaturan *grid boxparameter*. Hasil ini disimpan dalam format *.pdbqt.

Penyiapan Struktur Ligan

Struktur ligan-liganyang digunakan untuk pengujian berupa struktur 3D. Struktur 3D ligan-ligan diunduh dari PubChem dengan format *.sdf. Format ligan-ligan ini kemudian diubah menjadi *.pdb dengan menggunakan program Open Babel.Selanjutnya ligan-ligan tersebut dioptimasi dengan menggunakan AutodockTools. Optimasi tersebut berupa pengaturan *number of active torsion*. Hasil optimasi disimpan dalam format *.pdbqt.

Uji Toksisitas

Uji toksisitas dilakukan menggunakan perangkat lunak Toxtree. Parameter yang akan digunakan adalah prediksi tingkat karsinogenisitas dan mutagenisitas dari ligan. Prediksi ini dilakukan dengan menginput ligan dalam format*.sdf. Selanjutnya dipilih metode penentuan kriteria toksisitas pada senyawa. Estimasi dilakukan untuk melihat penentuan kriteria toksisitas suatu senyawa berdasarkan Toxtree.

Analisis Lipinski's Rule of Five

Analisis dilakukan dengan menggunakan Marvin Sketch. Kriteria *Lipinski's Rule of Five* terdiri dari berat molekul (kurang dari 500), jumlah hidrogen donor (tidak lebih dari 5 gugus hidrogen donor), jumlah akseptor hidrogen (tidak lebih dari 10 gugus hidrogen akseptor), nilai log P (tidak lebih dari 5) dan koefisien molar sebaiknya diantara 40-130.

Validasi Metode Penambatan Molekuler

Validasi penambatan molekuler dilakukan menggunakan Pymol. Validasi Evaluasi RMSD dilakukan dengan menentukan nilai RMSD berdasarkan rentang sebagai berikut: $RMSD \leq 1 \text{ \AA}$ untuk konformasi yang baik atau menyerupai yang sebenarnya, $1 \text{ \AA} < RMSD \leq 2 \text{ \AA}$ untuk konformasi yang mendekati sebenarnya, $2 \text{ \AA} < RMSD \leq 3 \text{ \AA}$ untuk konformasi dengan kesalahan dan $RMSD > 3 \text{ \AA}$ untuk konformasi yang buruk.

Penambatan Molekuler

Penambatan molekuler dilakukan menggunakan Autodock Vina. Protein dan ligan yang telah disimpan dalam format *.pdbqt disalin ke dalam folder Vina. Kemudian konfigurasi *file* vina diketik pada notepad, disimpan dengan nama „conf.txt“. Jumlah pengulangan (*exhaustiveness*) dilakukan sebanyak 8 kali. Vina dijalankan melalui Command Prompt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penyiapan Struktur

Makromolekul

Struktur makromolekul yang digunakan diperoleh dari *Protein Data Bank*. Identitas makromolekul yang dipilih adalah 3ln1. Makromolekul yang diunduh terikat dengan ligan dan molekul air. Ligan dan molekul air harus dihilangkan dari makromolekul karena dapat mengganggu dalam proses penambatan molekuler.Hasil penyiapan struktur molekul dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1. Visualisasi Struktur 3D Siklooksigenase-2 dengan Discovery Studio Visualizer 2016.

Hasil Penyiapan Struktur Ligan

Struktur senyawa aktif dari kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* L.) yang digunakan merupakan hasil

penelusuran pustaka. Sebagai senyawa pembanding digunakan selekoksib. Struktur ligan yang digunakan dalam penelitian ini berupa struktur 3D (Gambar2).

Keterangan: Hijau (atom C), abu-abu (atom H), merah (atom O), biru (atom N), Kuning (atom S), biru kehijauan (atom F)

Gambar 2. Struktur 3D Ksanton dan Selekoksib

Uji Toksisitas

Prediksi toksisitas ligan bertujuan untuk mengetahui karakter daya toksisitas dari masing-masing ligan. Hal ini perlu dilakukan untuk memprediksi efek merugikan yang dapat ditimbulkan jika digunakan untuk pengobatan. Pada

penelitian ini, penentuan sifat toksisitas dilakukan menggunakan perangkat lunak Toxtree. Sifat toksikologi difokuskan pada sifat karsinogenisitas dan sifat mutagenisitas. Hasil uji toksisitas dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 2. Prediksi toksisitas berdasarkan aturan Benigni/ Bossa

No	Senyawa	Parameter					
		A	B	C	D	E	F
1	α -Mangostin	√	-	-	-	-	√
2	β -Mangostin	√	-	-	-	-	√
3	γ -Mangostin	√	-	-	-	-	√
4	Mangostanol	√	-	-	-	-	√
5	Mangostenol	√	-	-	-	-	√
6	1-Isomangostin	√	-	-	-	-	√
7	1-Isomangostin hydrate	-	-	-	-	√	√
8	3-Isomangostin	√	-	-	-	-	√
9	3-Isomangostin hydrate	-	-	-	-	√	√
10	Toxyloxanthone A	√	-	-	-	-	√
11	Calabaxanthone	√	-	-	-	-	√
12	Demethylcalabaxanthone	√	-	-	-	-	√
13	Macluraxanthone	√	-	-	-	-	√
14	Euxanthone	-	-	-	-	√	√
15	BR-xanthone A	-	-	-	-	√	√
16	Mangostanin	√	-	-	-	-	√
17	Mangostenone A	√	-	-	-	-	√
18	Mangostinone	√	-	-	-	-	√
19	Gartanin	√	-	-	-	-	√
20	8-deoxygartanin	√	-	-	-	-	√
21	Garcinone A	√	-	-	-	-	√
22	Garcinone B	√	-	-	-	-	√
23	Garcinone C	√	-	-	-	-	√
24	Garcinone D	√	-	-	-	-	√
25	Garcinone E	√	-	-	-	-	√
26	Garcimangosone A	√	-	-	-	-	√
27	Garcimangosone B	-	-	-	-	√	√
28	Garcimangosone C	√	-	-	-	-	√
29	Garcimangosone D	-	-	-	-	√	√
30	Tovophyllin A	√	-	-	-	-	√
31	Selekoksisib	-	-	-	-	√	√

Ket:

- A. Peringatan struktur untuk sifat genotoksik karsinogenik
- B. Peringatan struktur untuk sifat nongenotoksik karsinogenik
- C. Potensi karsinogen berdasarkan QSAR
- D. Potensi mutasi oleh *S.tyhimurium* berdasarkan QSAR
- E. Tidak bersifat genotoksik karsinogenik
- F. Tidak bersifat nongenotoksik karsinogenik

Hasil prediksi toksisitas 30 senyawa xanton dari kulit buah manggis di simpulkan bahwa 24 senyawa diprediksi positif bersifat karsinogen dan 6 senyawa bersifat tidak karsinogen. Substruktur senyawa xanton yang bertanggung jawab atas karsinogenisitas yaitu alkenil benzen.

Analisis Lipinski's Rule of Five

Senyawa-senyawa kandidat obat ini harus memenuhi lima kriteria lipinski agar

bisa diserap dengan optimal oleh tubuh. Kriteria Lipinski terdiri atas: Berat molekul kurang dari 500, jumlah donor hidrogen tidak lebih dari 5, jumlah akseptor hidrogen tidak lebih dari 10, nilai Log P tidak lebih dari 5 dan refraktifitas molar berada antara 40-130 (Lipinski *et al.*, 2001). Hasil analisis Lipinski's dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 3. Aturan Lipinski beberapa senyawa xanton

No	Ligan	RO5	Berat Molekul	Donor Hidrogen	Akseptor Hidrogen	Log P	Refraktifitas Molar
1	1-Isomangostin hydrate		428,481	3	6	2,75	115,90
2	3-Isomangostin hydrate		428,481	3	6	3,40	115,90
3	Euxanthone		228,203	2	3	2,73	60,78
4	BR-xanthone A		396,439	2	5	3,96	107,64
5	Garcimangosone B		408,450	1	5	4,13	113,08
6	Garcimangosone D		392,360	6	9	0,40	94,72
7	Selekoksisib		381,37	1	3	3,83	92,23

Hasil menunjukkan bahwa dari enam senyawa xanton yang dianalisis,

Garcimangosone D tidak memenuhi kelima kriteria Lipinski. Kelima kandidat obat lainnya yang memenuhi kriteria Lipinski yaitu: 1-Isomangostin hydrate, 3-Isomangostin hydrate, Euxanthone, dan Garcimangosone B diasumsikan dapat terdistribusi dengan baik di dalam tubuh.

Senyawa yang tidak memenuhi aturan Lipinski tidak disarankan digunakan secara oral.

Validasi Penambatan Molekuler

Validasi penambatan molekuler bertujuan untuk mengkalibrasi dan

memvalidasi parameter penambatan molekuler yang akan digunakan oleh perangkat Autodock Vina.

RMSD (*Root Mean Standart Deviation*) merupakan nilai penyimpangan antara satu konformasi ligan natif kristalografi dengan ligan natif hasil optimasi penambatan. Evaluasi RMSD dilakukan dengan menentukan nilai RMSD berdasarkan rentang sebagai berikut: $RMSD \leq 1 \text{ \AA}$ untuk konformasi yang baik atau menyerupai yang sebenarnya, $1 \text{ \AA} < RMSD \leq 2 \text{ \AA}$ untuk konformasi yang mendekati sebenarnya, 2

$\text{\AA} < \text{RMSD} \leq 3 \text{\AA}$ untuk konformasi dengan kesalahan dan $\text{RMSD} > 3 \text{\AA}$ untuk konformasi yang buruk (Bajda, *et al.*, 2014). Hasil validasi penambatan

molekuler menggunakan Yasara 1,1353 $\text{\AA}$, hasil ini menunjukkan nilai konformasi yang mendekati sebenarnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Konformasi 3D ligan hasil tambat (biru) dengan natif ligan (kuning).
(Yasara, 2017)

Penambatan Molekuler

Penambatan molekuler menggunakan Autodock Vina dapat meningkatkan akurasi dari prediksi mode ikatan bila

dibandingkan dengan Autodock 4. Hasilnya penambatan molekuler dapat dilihat pada gambar 4

Gambar4. Hasil Penambatan Molekuler Senyawa Xanton dan Selekoksisib

Hasil penambatan molekuler menggunakan Autodock Vina menunjukkan nilai energi bebas Gibbs (ΔG) seluruh ligan uji bernilai negatif. Dari hasil penambatan molekuler, senyawa uji yang memiliki ΔG yang paling negatif adalah BR-xanthone A dengan -10,1 kkal/mol, diikuti oleh Garcimangosone B -9,3 kkal/mol,

Euxanthone -9,0 kkal/mol, 1-isomangostin hydrate -8,4 kkal/mol, dan 3-Isomangostin hydrate -8,2 kkal/mol. Senyawa pembanding selekoksisib memiliki energi afinitas -12,4 kkal/mol.

SIMPULAN

Hasil penambatan molekuler senyawa-senyawa xanton dari kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* L.) dengan enzim COX-2 menunjukkan bahwa BR-xanthone A (-10,1 kkal/mol) memiliki nilai energi bebas (ΔG) yang mendekati nilai energi bebas (ΔG) selekoksib (-12,4 kkal/mol). Senyawa ini juga diprediksi tidak bersifat toksik dan memenuhi aturan Lipinski. Oleh karena itu senyawa BR- xanthone A dari kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* L.) memiliki potensi sebagai kandidat obat antikanker payudara dengan menghambat aktifitas enzim COX-2.

SARAN

Hasil penambatan molekuler merupakan ramalan aktifitas biologis karena diperoleh dari simulasi pemodelan komputerisasi. Sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut validitas penambatan molekuler secara *in vitro* dan *in vivo*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Shah, R., Rosso, K., Nathanson, S.D. 2014. Pathogenesis, prevention, diagnosis and treatment of breast cancer. *World Journal of Clinical Oncology* 5:283-296.
- [2] Mitrasinovic, P.M., Mihajlovic, M.L. 2008. Recent Advances in Radiation Therapy of Cancer Cells: A Step towards an Experimental and Systems Biology Framework. *Current Radiopharmaceutical* 1:22-29.
- [3] Setiawati, A., Riswanto, F. O., Yuliani, S. H., & Istyastono, E. P. 2014. Anticancer Activity of Mangosteen Pericarp Dry Extract Against MCF-7 Breast Cancer cell line Through Estrogen Receptor- α . *Indonesian J. Pharm*, 25(3).
- [4] Kurose, H., Shibata, M.A., Linuma, M., Otsuki, Y. 2012. Alteration in Cell Cycle and Induction of Apoptotic Cell Death in Breast Cancer Cells Treated with Alfa-Mangostin Extracted from Mangosteen Pericarp. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*.
- [5] Soslow, R.A.*et al.* 2000. COX-2 is Expressed in Human Pulmonary, Colonic, and Mammary Tumors. *American Cancer Society* 89:2637-2645
- [6] RCSB. 2017. About the PDB Archive and the RCSB PDB: http://www.rcsb.org/pdb/static.do?p=general_information/about_pdb/index.html [8 Juli 2017].
PubChem. 2017. *Open Chemistry Database*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/compound> 6 Juli 2017.